

Salamandra

(*Salamandra salamandra*)

LC
Preocupació menor

Constitució robusta i força arrodonida, sense cresta dorsal.



Cua cilíndrica.

Pell de color negra brillant amb taques grogues.

Glàndules paròtides darrere dels ulls.

Cap ample.



No presenta membranes entre els dits.

ADULTS

MIDA: mitjana o gran, fins als 22 cm de longitud.

HÀBITAT: espècie típicament forestal, normalment associada a boscos caducifolis (rouredes, fagedes...). Té predilecció per ambients amb una elevada humitat com rius i rieres ombrívols.

COMPORTAMENT: bàsicament nocturna i terrestre, la seva activitat s'accentua després d'una pluja; llavors és fàcil veure-la creuant pistes forestals.

LARVA

MIDA: generalment fins als 6 cm de longitud.

HÀBITAT: basses, fonts, torrents o rieres ombrívols i oxigenades.

COMPORTAMENT: resta immòbil al fons. Si es veu amenaçada, s'amaga ràpidament entre la vegetació.


Cresta dorsal poc desenvolupada.

Coloració marró-grisenca.



Punts blancs a la base de les extremitats.

Mapa de distribució



Linea temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Capgrossos
Gener	●	●
Febrer	●	●
Març	●	●
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol	●	●
Agost	●	●
Setembre	●	●
Octubre	●	●
Novembre	●	●
Desembre	●	●

Amb el suport de:

Tritó pirinenc

(*Calotriton asper*)

NT

Gairebé
amenaçat

Tritó del Montseny

(*Calotriton arnoldi*)

CR

Criticament
en perill
d'extinció

C. asper té una coloració dorsal variable on predominen tons ocracis i grisosos podent presentar una línia vertebral, ventralment acostumen a presentar una franja central de tons vermells, ataronjats o groguencs.



Línia vertebral groga
sobretot en juvenils.

C. arnoldi presenta el dors color xocolata podent tenir iridescències daurades (poblacions occidentals) o taques grogues (poblacions orientals), compta amb una taca blanquinosa a la gola i el ventre de color crema amb puntejat fosc.



Amb protuberàncies còrnies al tronc i punta
dels dits. Cua comprimida lateralment.
Sense crestes ni membranes entre els dits.

ADULTS

MIDA: entre els 9-12 cm de longitud cap-cua.

HÀBITAT: espècies pròpies de mitja i alta muntanya (entre els 700 i els 2.550 m d'alçada) on habiten torrents d'aigües amb corrents fredes, ben oxigenades i pedregoses. *C. asper* també es pot trobar en estanys d'alta muntanya i cursos d'aigua subterranis.

COMPORTAMENT: ambdós de vida aquàtica tot i que *C. asper* pot sortir al terra. Majoritàriament nocturn, però no és difícil trobar-lo de dia.

LARVA

MIDA: mitjana, d'uns 6 cm de llargada total normalment.

HÀBITAT: igual al dels adults, però prefereixen amagar-se entre les fissures i escletxes.

COMPORTAMENT: més discret que els adults. Es troba al substrat i confia en la seva coloració per passar desapercebudes.

Cresta dorsal poc
desenvolupada,
comença a la part
posterior del tronc.




Cap
lleugerament
allargat.

Cua musculada, amb l'extrem arrodonit i
aleta caudal poc més ampla que el cos.

POSTA

Entre 15 i 50 ous col·locats per separat sota pedres submergides.

Mapa de distribució



Linea temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Larves
Gener	●	
Febrer	●	●
Març	●	●
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol	●	●
Agost	●	
Setembre	●	
Octubre	●	
Novembre	●	
Desembre	●	

Amb el suport de:

Tritó verd

(*Triturus marmoratus*)



Preocupació menor

Línia vertebral ataronjada en femelles i exemplars joves.



Cresta dorsal molt desenvolupada en els mascles en zel.



Coloració verdosa amb taques negres. Exemplars joves més contrastats.

Constitució cilíndrica, cap lleugerament aplanat i musell arrodonit.

ADULT

MIDA: el mascles entre 12 i 14 cm i les femelles fins als 15 cm.

HÀBITAT: bosc mediterrani; estany, basses o tolles de rierols amb poc o nul corrent. Zones amb abundant vegetació aquàtica.

COMPORTAMENT: activitat preferentment nocturna, se'l pot veure per sobre o entre la vegetació aquàtica. Sovint puja a respirar a la superfície.


LARVA

MIDA: fins als 7 cm de longitud.

HÀBITAT: estany, basses o tolles grosses de rierols amb poc o nul corrent i sense peixos.

COMPORTAMENT: de nit surt del seus refugis entre la vegetació subaquàtica i depreda petits invertebrats.

Cua amb taques fosques arrodonides. La punta acaba amb un filament.



Cap lleugerament aplanat, ulls grossos.




Dits de les extremitats molt llargs i prims.

POSTA

Ous dipersos de manera individual, embolcallats entre la vegetació aquàtica. Fins als 300 ous.

Mapa de distribució



Línia temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Larves
Gener	●	●
Febrer	●	●
Març	●	●
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol	●	●
Agost	●	●
Setembre	●	●
Octubre	●	●
Novembre	●	●
Desembre	●	●

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat



Tritó palmat

(*Lissotriton helveticus*)



Preocupació menor



Femelles de coloració menys contrastada, sense cresta caudal.

Constitució prima, secció del cos de forma quadrangular.



Els mascles presenten un filament a l'extrem de la cua.

Pell llisa de color ocre-ataronjada, amb una línia vertebral de color taronja.

Mascles de coloració més contrastada, presenta cresta caudal i les extremitats posteriors palmejades durant el zel.

ADULT

MIDA: fins als 8,5 cm de longitud.

HÀBITAT: zones amb una pluviometria elevada i amb vegetació abundant. Aprofita masses d'aigua sense o amb poc corrent i sense peixos.

COMPORTAMENT: activitat preferentment nocturna i aquàtica. Se'ls pot veure per sobre o entre la vegetació aquàtica.


LARVA

MIDA: fins als 4 cm de longitud.

HÀBITAT: masses d'aigua amb vegetació aquàtica sense corrent, com llacs de muntanya, tolls en prats de pastura, petits pantans, abeuradors, rierols de corrent suau, basses fluvials...

COMPORTAMENT: força estàtic, però s'amaga ràpidament si es veu amenaçat. Més activa durant la nit, quan caça petits invertebrats.

Mapa de distribució



Linea temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Larves
Gener	●	
Febrer	●	●
Març	●	●
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol	●	●
Agost	●	
Setembre	●	
Octubre	●	
Novembre	●	
Desembre	●	

Dits curts.



Coloració crema o ataronjada.

Cap allargat.

POSTA

Ous dispersos individualment, embolcallats entre la vegetació aquàtica de manera que quedin protegits.

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

associació
hàbitats



Societat Catalana
d'Herpetologia
www.soccathep.org

PAISATGES
VIUS

Tòtil comú

(*Alytes obstetricans*)



Coloració dorsal grisenca, marró o crema, amb taques de fons més fosques.

Aspecte rabassut. Cap ample amb musell arrodonit.

Pupila vertical i iris daurat i puntejat negre.

Timpà ben visible i més petit que l'ull.

A la part lateral s'estén una filera de berrugues normalment ataronjades.



Potes anteriors curtes i membranes entre els dits gairebé absents.

ADULT

MIDA: petit, d'uns 4-6 cm aproximadament de longitud.

HÀBITAT: es troba en una gran diversitat d'hàbitats, fins i tot en zones urbanes. Prefereix zones obertes, però també present en terreny forestal amb humitat considerable.


COMPORTAMENT: nocturn i d'hàbits terrestres. Sol enterrar-se però també pot passar el dia sota lloses o troncs en descomposició. El cant és un xiulet semblant al del xot, però més curt.

CAPGRÓS

MIDA: mitjana, d'uns 7 cm total normalment.

HÀBITAT: petits rierols amb tolles i altres petites masses d'aigua com fonts o basses. En el Pirineu també es pot trobar en estanys.

COMPORTAMENT: acostuma a trobar-se al fons de la massa d'aigua.



Taca fosca entre la cua i el cos.

Coloració bruna o grisenca. Cua musculada amb nombrosos puntets foscos.

Musell arrodonit.




Cua no acaba en punta.

POSTA

D'uns 40 ous aproximadament. Els mascles són els encarregats de portar-los en les seves potes posteriors i protegir-los fins la seva eclosió. Coloració dels ous variable.



Mapa de distribució



Linea temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Capgrossos
Gener		●
Febrer	●	●
Març	●	●
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol	●	●
Agost	●	●
Setembre	●	●
Octubre	●	●
Novembre		●
Desembre		●

Amb el suport de:




Granota pintada

(*Discoglossus pictus*)



Forma "pintada"



Pupila en forma de cor / arrodonida.

La forma "pintada", amb un disseny de "camuflatge marró", és la més comuna. També hi ha les formes "llisa vermellosa", i la forma ratllada (marró, amb una línia vertebral clara). Coloració mai verda.

Forma "llisa vermellosa"



Forma "ratllada"



Els mascles en zel d'aquesta i d'altres espècies tenen callositats negres als dits més interns de la mà.

La pell pot ser més rugosa si ens trobem l'animal lluny de l'aigua, però en general és fina i poc berrugosa.

ADULT

MIDA: mitjana o gran, 5 o 6 cm de longitud cap-cos normalment.

HÀBITAT: més abundant a zones planes i de fàcil entollament, però molt generalista. Freqüentment a prop de basses, bassols i tolls laterals de rieres i rius.

COMPORTAMENT: nocturna en general. Pot aparèixer amb molta abundància en nits de pluja desplaçant-se saltant per les carreteres i camins. Tenen un cant molt poc sonor que no permet detectar-les pel so.

CAPGRÓS

MIDA: mitjana-petita, 3 o 4 cm de llargada normalment.

HÀBITAT: sobretot en basses temporànies i efímeres, o en cursos d'aigua de poca entitat. Poc freqüent a grans cossos d'aigua.

COMPORTAMENT: en general ocupa el fons, però també aprofita una mica la columna d'aigua.

Ulls bastant junts a la part alta del cap.

Sovint es percep la zona de les brànquies internes molt vermella.



A petita escala, té un reticulat fi i irregular, sense dibuix clar, a la cua.

Coloració variable, normalment grisosa quan el capgròs és petit, tornant-se més bruna al créixer. Mai verda, ni completament negra.

POSTA

Una massa d'ous foscos desorganitzada i dispersa pel fons.



Mapa de distribució



Línia temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Capgrossos
Gener	●	●
Febrer	●	●
Març	●	●
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol	●	●
Agost	●	●
Setembre	●	●
Octubre	●	●
Novembre	●	●
Desembre	●	●


Amb el suport de:



Granoteta de punts

(*Pelodytes punctatus*)

LC
Preocupació menor



Extremitats posteriors llargues amb dits també especialment llargs i petites membranes interdigitals.



Coloració de fons grisenc o marró amb unes petites taques verdes o taronges. Ventre blanc.

ADULTS

MIDA: petit. Pot arribar als 4,5 cm.

HÀBITAT: s'adapta a diferents ambients però es sol trobar per sota dels 800 m. Prefereix ambients mediterranis de terra baixa i es troba des de boscos esclarissats fins a espais conreats. És comú en afloraments de roca calcària i ambients amb abundants fissures i refugis.


COMPORTAMENT: predominantment nocturn. Quan s'espanta tendeix a saltar a l'aigua per amagar-se sota el fang (*Pelos*= fang, *dytas*= bussejar). Cant dels mascles semblant al grinyolar d'un tap de suro o una porta vella. Canten des de la vegetació o sota l'aigua.

CAPGRÓS


MIDA: mitjana. Fins als 6,5 cm i ocasionalment arriba als 9,5 cm.

HÀBITAT: petites o mitjanes basses i tolles d'aigua estacionals.

COMPORTAMENT: sol romandre al substrat i moltes vegades formen grans agrupacions produïdes per l'assecamment de les masses d'aigua. Poden arribar a morir si la sequera és persistent.



Sovint amb fileres de petits punts clars sobretot a la zona de la cara.



Acostuma a presentar un patró en "reixa".


Cua llarga i acabada en punta.

POSTA


Cordons de 40-100 ous adherits a la vegetació subaquàtica.



Ous negres i col·locats en espiral.
Les larves s'adhereixen al acabar de sortir de l'ou.



Mapa de distribució



Linea temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Capgrossos
Gener	●	●
Febrer	●	●
Març	●	●
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol		
Agost		
Setembre	●	
Octubre	●	●
Novembre	●	●
Desembre	●	●

Amb el suport de:

Gripau comú

(*Bufo spinosus*)



Aspecte rabassut, pell gruixuda i coberta dorsalment de berrugues.

Cap ample i musell curt i arrodonit.

Paròtides disposades obliquament.

Ulls amb pupil·la horitzontal amb iris vermells.

Extremitats curtes però més llargues que el gripau corredor. Amb membranes entre els dits de les potes posteriors.



Amplexus (=aparellament) de *B. spinosus*

Coloració dorsal marró amb un patró variable (de uniforme fins a taques clares i fosques).

ADULT

MIDA: el més gran d'Europa. Entre 10-15 cm.

HÀBITAT: ocupa ambients molt diversos però sovint es troba associat a boscos humits caducifolis. En zones àrides és més escàs.


COMPORTAMENT: nocturn, es refugia de dia en refugis subterranis. Per defensar-se infla el seu cos per augmentar el seu volum o secreta substàncies irritants nocives per nosaltres. Cant agut i poc sonor. Els mascles pot emetre una crida de perill quans se'ls manipula.

CAPGRÓS

MIDA: petits. Fins als 4 cm.

HÀBITAT: grans masses d'aigua permanents com llacunes o rius.

COMPORTAMENT: forma grups nombrosos i es pot trobar des de la part fonda fins a la superficial de la columna d'aigua.



Musell i punta de la cua arrodonits

Cresta només a la cua

Negre amb ventre grisós

Els juvenils no presenten línia vertebral i tenen les paròtides marcades.



POSTA


Cada femella pon dos cordills d'ous de fins a 5 m de longitud i fins a 8000 ous. Sovint entrellaçats entre la vegetació.



Acostumen a ser més gruixudes que les de *E. calamita*



Mapa de distribució



Línia temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Capgrossos
Gener	●	
Febrer	●	
Març	●	●
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol	●	●
Agost	●	●
Setembre	●	●
Octubre	●	
Novembre	●	
Desembre	●	

Amb el suport de:




Gripau corredor

(*Epidalea calamita*)



Preocupació menor



ADULT

MIDA: mitjana en general (5 o 6 cm), però amb màxims de gairebé 10 cm de longitud.

HÀBITAT: prefereix àrees planes i espais oberts amb facilitat d'entollament. En general defuig zones boscoses i terrenys accidentats.

COMPORTAMENT: gairebé sempre camina o corre en comptes de saltar. Cant bastant sorollós.

CAPGRÓS

MIDA: petit en general, màxim uns 3 cm.

HÀBITAT: es troba sobretot en cossos d'aigua temporanis i amb poca vegetació circumdant. També en petits cursos d'aigua sorrencs amb risc d'assecar-se.

COMPORTAMENT: les postes són abundants i creen «núvols negres» de capgrossos que poden arribar a ser molt densos i nombrosos, s'espanten en grup quan apareix alguna amenaça.

Mida petita, provinents de postes molt abundants (acostumem a trobar-ne molts de junts). Coloració molt fosca (o directament negra) durant la major part de la vida del capgròs.



Alguns exemplars mostren una taca blanca dessota la regió bucal.

Només quan s'acosta la metamorfosi viren a color marró, i mostren fins i tot una línia vertebral clara com els adults.




POSTA

Cordons llargs gelatinosos amb els ous a dins, disposats en fileres d'un, dos o màxim tres ous.



Mapa de distribució



Linea temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Capgrossos
Gener	●	●
Febrer	●	●
Març	●	●
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol	●	●
Agost	●	●
Setembre	●	●
Octubre	●	●
Novembre	●	●
Desembre	●	●

Amb el suport de:



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat



Societat Catalana
d'Herpetologia
www.soccatherp.org




Reineta

(*Hyla meridionalis*)



Preocupació menor



Pupila horitzontal.

Línia fosca que en general no segueix més enllà de les extremitats anteriors, mai fa forma de coma just davant de les posteriors.

Dits amb discs terminals adherents.



Mascles amb gola groguenca de pell flexible.

Pell llisa i fina, sovint verd brillant, però pot ser marronosa. En alguns exemplars blau cel. Capacitat de canviar de color marró-verd en poques hores. Ventre blanc.

ADULT

MIDA: més aviat petita, màxim 4 cm de longitud cap-cos.

HÀBITAT: la única espècie semiarborícola de la nostra fauna. Preferentment habiten en zones amb vegetació arbustiva abundant.

COMPORTAMENT: sovint s'assolella a la vegetació a mitja alçada (~ 1 m). Els mascles canten, normalment de nit, des de la vegetació o des de dins de l'aigua. Cant molt sorollós, possiblement el que més al nostre país.

CAPGRÓS

MIDA: mitjana, d'uns 4 cm totals normalment.

HÀBITAT: preferentment en aigües amb abundant vegetació circumdant i emergent. Dins de l'aigua, és l'espècie de capgrós que fa servir més freqüentment la columna lliure de l'aigua.

COMPORTAMENT: adreça el cos o fa petits impulsos fent servir només petits moviments de la punta de la cua.



Ulls molt separats.




Coloració general amb brillantor verdosa o daurades.


Línies longitudinals fosques.

POSTA

Cada femella pon diversos paquets de pocs ous (1-20), enganxats a la vegetació. Ous clars, però amb un pol més fosc (gris-bru) que l'altre (gairebé blanc).



Mapa de distribució



Linea temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Capgrossos
Gener	●	
Febrer	●	
Març	●	●
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol	●	●
Agost	●	●
Setembre	●	●
Octubre	●	
Novembre	●	
Desembre	●	

Amb el suport de:

Granota roja

(*Rana temporaria*)



Preocupació menor



Taca fosca darrere de l'ull.

Timpà visible, de mida més petita que l'ull.



Pell llisa, de color marronosa, vermellova, ataronjada o grisca amb taques marrons irregulars.

ADULT

MIDA: mida mitjana, generalment fins als 9 cm però pot arribar als 11 cm.

HÀBITAT: des dels 300 m, on ocupa rouredes i fagedes humides, fins als 2800 m, on habita prats alpins frescos.

COMPORTAMENT: tant diürna com nocturna. Es pot trobar lluny del punt d'aigua, en llocs humits i frescos. Es desplaça fent grans salts.

CAPGRÓS

MIDA: fins als 4,6 cm.

HÀBITAT: rius i rieres, estanys de muntanya, molles i tot tipus de tolls temporals. Generalment llocs amb poc o nul corrent.


COMPORTAMENT: reposa al fons de la massa d'aigua. Si es veu amenaçats s'amaga sota el fang o la vegetació.

Cua llarga i musculada acabada lleugerament en punta.



Coloració fosca amb petits punts daurats.

Mapa de distribució



Linea temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Capgrossos
Gener	●	●
Febrer	●	●
Març	●	●
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol	●	●
Agost	●	●
Setembre	●	●
Octubre	●	●
Novembre	●	●
Desembre	●	●

POSTA

Massa globosa i gelatinosa a escassa fondària, ous de mida gran.



Amb el suport de:



Granota verda

(*Pelophylax perezii*)



Granota de Graf

(*Pelophylax kl. grafi*)



Musell allargat i ulls prominents amb iris daurat.

Amb un timpà ben gran.



Pell amb rugositats dorsals i laterals. Ventre llis i clar.

Mascles amb sacs vocals als costats de la mandíbula.

Coloració dorsal variable però predominen els tons marrons o verdosos tacats de fosc.



Extremitats posteriors adaptades al salt amb membranes entre els dits.

És difícil diferenciar les dues espècies a simple vista.

P.kl.grafi és més robusta amb les extremitats posteriors més desenvolupades.

ADULT

MIDA: mitjana-gran. *P.perezii* pot arribar al voltant dels 8 cm mentre que *P.kl.grafi* mesura 10,2 cm.

HÀBITAT: es troba en una àmplia gamma d'ambients aquàtics permanents, des de rius i rieres fins a maresmes un xic salobres. Es troba des de terra baixa fins a diferents hàbitats de muntanya.

COMPORTAMENT: presenta activitat diürna i nocturna. Acostuma a romandre prenent el sol de dia a la vora del punt d'aigua. Per defensar-se secreta un mucus gelatinós. Pot passar l'hivern sota el llot del fons del punt d'aigua.


CAPGRÓS

MIDA: mitjana-gran, pot arribar als 9 cm de longitud.

HÀBITAT: igual que els adults.

COMPORTAMENT: es troba per tot el perfil de la columna d'aigua. Acostuma a triar les zones menys exposades.

Mapa de distribució




Linea temporal de probabilitat de detecció

	Adults	Capgrossos
Gener	●	
Febrer	●	
Març	●	
Abril	●	●
Maig	●	●
Juny	●	●
Juliol	●	●
Agost	●	●
Setembre	●	●
Octubre	●	●
Novembre	●	
Desembre	●	



Coloració gris-brunenca, amb taques i ventre clar.



Cap lleugerament allargat.

Cua llarga, musculada i acabada en punta.

POSTA

Gran massa globosa que pot contenir varis centenars d'ous de mida gran. Es solen trobar sobre la vegetació o surant en l'aigua.



Amb el suport de:

